


Klišťata mohou přenášet infekční nemoci - klišťový zánět mozkových blan, lymeskou boreliózu a další. Proto je nutné po dobu několika měsíců ode dne odstranění klišťete sledovat možné příznaky onemocnění: zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti kloubů, příznaky připomínající chřipku, nechutenství, červená zvětšující se skvrna v místě přisátí. V případě, že se i po delší době objeví jen jediný z vyjmenovaných příznaků, navštivte dětského lékaře a předejte mu toto sdělení.  
Upozornění: Pokud je dítě očkováno proti klišťatům, je očkováno pouze proti klišťovému zánětu mozkových blan (klišťové encefalitidě), nikoliv proti lymeské borelióze nebo dalším onemocněním.



Klišťata mohou přenášet infekční nemoci - klišťový zánět mozkových blan, lymeskou boreliózu a další. Proto je nutné po dobu několika měsíců ode dne odstranění klišťete sledovat možné příznaky onemocnění: zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti kloubů, příznaky připomínající chřipku, nechutenství, červená zvětšující se skvrna v místě přisátí. V případě, že se i po delší době objeví jen jediný z vyjmenovaných příznaků, navštivte dětského lékaře a předejte mu toto sdělení.  
Upozornění: Pokud je dítě očkováno proti klišťatům, je očkováno pouze proti klišťovému zánětu mozkových blan (klišťové encefalitidě), nikoliv proti lymeské borelióze nebo dalším onemocněním.

